



Renard

 Pour les articles homonymes, voir **Renard** (homonymie).
renard

Nom commun ou
nom vernaculaire ambigu :
L'appellation « **renard** » s'applique en français à
plusieurs taxons distincts. 

Un renard roux (*Vulpes vulpes*)
au British Wildlife Centre, en Angleterre. Il s'agit de
l'espèce la plus connue et la plus répandue.

Taxons concernés

Dans la famille des canidés :

Les genres :

- *Atelocynus* (renard à petites oreilles)
- *Vulpes* (“vrais” renards)
- *Cerdocyon* (renard des savanes)
- *Dusicyon* (renard des Falkland †)
- *Otocyon* (renard à oreilles de chauve-souris)
- *Lycalopex* (faux renards)
- *Urocyon* (renards gris)

Renard est un terme ambigu qui désigne le plus souvent en français les canidés du genre *Vulpes*, le plus commun étant le Renard roux (*Vulpes vulpes*). Toutefois, par similitude physique, le terme est aussi employé pour désigner des canidés appartenant à d'autres genres, comme les genres *Atelocynus*, *Cerdocyon*, *Dusicyon*, *Otocyon*, *Lycalopex* et *Urocyon*.

1 Nomenclature et étymologie

1.1 Étymologie

Jusqu'à la fin du XVII^e siècle^[1], le renard est encore fréquemment appelé un *goupil*^[2]. Le terme actuel de *renard*, pour désigner l'animal, n'est autre que le prénom *Renart* donné au *goupil* héros du *Roman de Renart*. Au centre de ce recueil d'histoires imaginaires, Renart le goupil est

très rusé et les tours qu'il joue aux autres animaux et aux humains ont rendu le personnage très célèbre (on disait : « malin comme Renart »). De ce fait, son prénom s'est substitué à *goupil* par éponymie.

Renard a été graphié *Renart* jusqu'au milieu du XVI^e siècle. Le nom propre est tiré d'un anthroponyme francique **Raginhart*, composé des éléments **ragin* (« conseil ») (cf. Raimbaud, Rainfroy^[3]), et **hard* (« dur », « fort ») (cf. le suffixe français *-ard*). Il a pour équivalents les prénoms moyen néerlandais *Reynaerd* et vieux haut allemand *Reginhart* (allemand *Reinhard*).

Quant au terme *goupil*, il est attesté sous les formes *gupil* en 1155, *volpil* en 1180, *golpiz* en 1120, *gupil* en 1121-34. Il procède du gallo-roman **WULPĪCULU*, variante du latin populaire **vīlpīculus*^[4] ou du bas latin *vulpiculus*^[5], dont sont directement issus l'occitan *volpilh* et l'ancien italien *volpiglio*. La forme masculine *vulpiculus* est une altération du latin classique *vulpēcula* « petit renard » (qui a donné l'espagnol *vulpeja*), diminutif de *vulpēs* « renard » en latin classique^[5], d'où l'italien moderne *volpe*. Le passage de [v] à [w] en gallo-roman s'explique par l'influence phonétique du francique (peut-être inspirée dans ce cas par le vieux bas francique **wulf* « loup »), ensuite [w] se durcit régulièrement en [g^w], puis se délabialise en [g] en français central et à l'ouest, mais pas dans les dialectes d'oïl septentrionaux (ex : bas-lorrain, champenois, picard, ancien normand septentrional *woupil*).

Le latin *vulpēs* est issu de l'indo-européen commun **(H)ulp-i-*, qui est continué par l'avestique *urupi* « martre » et le lituanien *vilpišys* « chat sauvage », ainsi que par des formes dérivées comme le persan *rubâh* (روباه) ‏‎ « renard » et le sanskrit *lopāśá* « chacal »^[6].

1.2 Vocabulaire

- Le renard est un canidé.
- Le petit du renard est le « renardeau ».
- La femelle du renard est la « renarde ».
- Le renard « glapit » (cri bref, peu sonore) et « jappe », aboiement aigu (jappement) en période de rut, qui s'entend très loin.
- Le renard pratique le « mulotage » pour chasser.
- Les excréments du renard sont des « laissées ».

1.3 Noms en français et noms scientifiques correspondants



Le renard des sables (*Vulpes zerda*) ou fennec est la plus petite espèce de renards et de canidés au monde. Il est présent surtout dans le désert du Sahara.



Le renard gris insulaire est une espèce en danger de disparition.



Un renard roux, l'espèce la plus commune.

Liste alphabétique de noms vernaculaires attestés^[7] en français.

Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide. En gras, l'espèce la plus connue des francophones.



Un renard polaire dans la neige. Il fréquente les régions arctiques.

- Renard - souvent les espèces du genre *Vulpes*^[8] et en particulier le renard roux^[8]
- renard afghan - voir renard de Blandford
- renard d'Amérique - *Lycalopex* sp.^[8]
- renard d'Amérique latine - *Lycalopex* sp.^[9]
- renard d'Amérique du Sud - *Lycalopex* sp.^[9]
- renard des Andes ou renard andin - *Lycalopex culpaeus*^[9]
- renard arctique - voir renard polaire^{[10],[8]}
- renard d'Azara (ou renard d'Aszara) - *Lycalopex gymnocercus*^[8]
- renard du Bengale - *Vulpes bengalensis*^[11]
- renard blanc - voir renard polaire^[12]
- renard de Blandford - *Vulpes cana*^[11]
- renard bleu - voir renard polaire^[12]
- renard blond des sables - voir renard pâle^[8]
- renard du Brésil - voir renard chenu^[8]
- renard du Cap - *Vulpes chama*
- renard-chaton à longues oreilles - voir renard nain
- renard chenu - *Lycalopex vetulus*^[8]
- renard commun - voir renard roux^{[10],[12],[8],[11]}
- renard corsac - voir renard des steppes^[8]
- renard côtier - *Lycalopex sechurae*^[9]
- renard crabier - voir renard des savanes^{[8],[9],[9],[11]}
- renard culpeo - voir renard des Andes^[9]
- renard de Darwin - *Lycalopex fulvipes*
- renard des Falkland - *Dusicyon australis* †

- renard du désert austral - *Lycalopex sechurae*^[8]
- renard du désert de Sechura - voir renard du désert austral
- renard d'Europe - voir renard roux^[9]
- renard famélique - *Vulpes rueppellii*^[8]
- renard à grandes oreilles - voir renard nain^[8]
- renard gris - *Urocyon* sp. et surtout *Urocyon cinereoargenteus*^{[10],[9]}
- renard gris d'Amérique - *Urocyon cinereoargenteus*
- renard gris argenté - voir renard gris d'Amérique^[8]
- renard gris d'Argentine - *Lycalopex griseus*^[8] et *Lycalopex culpaeus*^[9]
- renard gris insulaire - *Urocyon littoralis*^{[8],[9]}
- renard gris de Patagonie - *Lycalopex griseus*^[8]
- renard isatis - voir renard polaire^[8]
- renard insulaire - renard gris insulaire^[9]
- renard de Magellan - voir renard des Andes
- renard nain - *Vulpes macrotis*
- renard à oreilles de chauve-souris - *Otocyon megalotis*^{[10],[8],[9]}
- renard pâle - *Vulpes pallida*^[8]
- renard de la pampa - *Lycalopex gymnocercus*^{[8],[11]}
- renard de Patagonie - voir renard gris de Patagonie
- renard à petites oreilles - *Atelocynus microtis*^{[8],[9]}
- renard polaire - *Vulpes lagopus*^{[10],[12],[8]}
- renard rouge - voir renard roux
- **renard roux** - *Vulpes vulpes*^{[10],[9]}
- renard de Rüppell - voir renard famélique
- renard des sables 🐾
- renard des savanes - *Cerdocyon thous*^{[10],[9]}
- renard des steppes - *Vulpes corsac*^[8]
- renard du Tibet - *Vulpes ferrilata*
- renard vélocé - voir renard nain^[9] et *Vulpes velox*
- renard vulgaire - voir renard roux^[9]

2 Physiologie, comportement et écologie

Les caractéristiques générales des renards sont celles des Canidés, avec des nuances pour chaque espèce : voir les articles détaillés pour plus d'informations sur leur comportement ou leur physiologie respective.

2.1 Caractéristiques communes

Les points communs des différents genres de canidés usuellement rassemblés sous le nom *renard* sont :

- un museau allongé,
- des oreilles dressées,
- une petite taille (60 à 75 cm pour le corps, et 35 à 50 cm pour la queue),
- un poids d'environ 6 kg.

Le pelage du renard est généralement brun-roux, mais cela peut varier du beige au brun et au roux vif. Ses oreilles dressées sont noires en arrière et sont plus grandes que celles du renard polaire. La queue est longue et touffue et généralement blanche au bout. Le tour de la gueule et la gorge sont souvent blancs mais la gorge peut varier au gris. Au début du printemps, il perd ses poils d'hiver. Ils apparaissent d'abord en bas des pattes puis apparaissent sur le corps, sur les flancs en juillet et sur la queue et le corps en fin août. Au début de l'hiver, le pelage s'épaissit.

Les renards vivent généralement entre 2 et 3 ans, mais leur espérance de vie peut aller jusqu'à 10 ans et même plus, lorsqu'ils sont en captivité.

Les renards sont des vecteurs de la rage, de la trichinose ou de l'échinococcose alvéolaire, maladie qui peut se révéler mortelle chez l'homme. Il faut souligner que cette pathologie se découvre plusieurs années après l'avoir contractée : certaines personnes sont mortes car on croyait à un cancer du foie. Ces maladies sont transmises par la salive ou les excréments des carnivores porteurs ou par ingestion d'aliments souillés par eux.

Quand ils chassent, les renards approchent doucement de leur proie, puis bondissent pour la plaquer au sol. Cette pratique s'appelle le « mulotage ».

En revanche l'habitat ou les données biologiques et comportementales peuvent varier selon l'espèce voire la sous-espèce.

2.2 Prédateurs

En raison de l'élimination récente et généralisée par l'Homme des grands canidés et des grands félins, les prédateurs du haut de la pyramide alimentaire dans de nom-

breux écosystèmes terrestres sont maintenant des carnivores de taille moyenne (tels que les lynx ou coyotes^[13] en Amérique du Nord). Or, bien qu'étant un prédateur relativement généraliste, le coyote élimine volontiers ses concurrents prédateurs, et notamment le renard^[13].

Il est démontré que l'activité prédatrice du coyote favorise l'abondance des oiseaux chanteurs et même l'abondance de certains rongeurs ainsi que la diversité biologique. Ceci s'explique par le fait qu'ils réduisent les populations de chiens et de chat domestiques ainsi que de renards^[13] (ce qui montre au passage l'importance du renard en matière de lutte contre les rongeurs).

La réintroduction ou le confortement de populations de loup gris dans de nombreuses régions d'Amérique du Nord va à nouveau modifier la chaîne d'interactions prédateurs-proies^[13] ; Une étude basée sur une série chronologique de 30 ans de suivi du loup, du coyote, du renard et de leur abondance relative dans l'état du Minnesota (États-Unis) montre en effet que le retour des loups réduit également (ou supprime parfois) à son tour des populations de coyotes^[14], ce qui redonne au renard sa position de *mésoprédateur*, et qui pourrait lui permettre d'à nouveau et mieux réduire les pullulations de petits rongeurs^[13].

Ainsi, une prédation plus marquée par les petits prédateurs (renards et mustélidés), et moins marquée par les coyotes (prédateurs de moyenne envergure) grâce à leur contrôle par quelques « grands » prédateurs (loup, cougar, lynx) pourrait être plus semblable au potentiel écologique et à l'écosystème historique qui était en place avant la disparition ou régression du loup du « sommet de la pyramide »^[13] (cette situation n'est néanmoins pas comparable à la situation pré-historique où les grands prédateurs étaient non seulement plus nombreux mais aussi beaucoup plus grands et plus puissants que le loup (Lion d'Amérique, Tigre à dents de sabre, Ours à face courte...), même après 3 ères glaciaires et au début de l'actuel inter-glaciaire,

La « déstructuration » ou la « restructuration » des communautés de prédateurs en raison de la perte ou de la restauration des populations de moyens et/ou grands prédateurs est susceptible de modifier le spectre de taille des proies consommées massivement, avec des implications importantes, directes et indirectes, pour la biodiversité^[15] et la santé humaine^{[13],[16]}.

3 Les renards dans la culture

Articles détaillés : Renard dans la culture, Symbolique du renard et Liste des renards de fiction.

Le renard est un terme recouvrant de nombreuses espèces mais, dans l'imaginaire populaire, il évoque surtout le renard commun ou renard roux. C'est une figure culturelle ancestrale, présente dans tous les domaines, tant symboliques ou folkloriques qu'artistiques.

Il est également associé à la ruse dans de nombreux ouvrages littéraires, notamment le Roman de Renart et les Fables de La Fontaine.

4 Notes et références



- [1] Collectif, *La Trésor de la langue française informatisée*, art. « renard », sur Internet, accédé le 27 avril 2013 : .
- [2] Lorsque le renard était un *goupil*, la lapin était un *conil*
- [3] Louis Guinet, *Les Emprunts gallo-romans au germanique*, Paris, Klincksieck, 1982.
- [4] Albert Dauzat, Henri Mitterand, Jean Dubois, *Nouveau dictionnaire étymologique Larousse*, éditions Larousse 1980, p. 349a.
- [5] site du CNRTL : étymologie de “goupil”
- [6] (en) Michiel Vaan, *Etymological dictionary of Latin and the other Italic languages*, Leiden Boston, Brill, 2008 (ISBN 9789004167971), « volpēs », p. 688.
- [7] Attention aux appellations et traductions fantaisistes circulant sur l'Internet
- [8] Meyer C., ed. sc., 2009, *Dictionnaire des Sciences Animales. consulter en ligne*. Montpellier, France, Cirad.
- [9] (en) Murray Wrobel, 2007. *Elsevier's dictionary of mammals : in Latin, English, German, French and Italian*. Elsevier, 2007. ISBN 0-444-51877-0, 9780444518774. 857 pages. Rechercher dans le document numérisé
- [10] Nom vernaculaire français d'après *Dictionary of Common (Vernacular) Names* sur Nomen.at
- [11] Annexes au Journal officiel des Communautés européennes du 18 décembre 2000. Lire en ligne.
- [12] (en) Derwent, *Thesaurus of agricultural organisms : pests, weeds and diseases*, Volume 1. Derwent Publications, Ltd. Éditions CRC Press, 1990. 1529 pages. ISBN 0-412-37290-8, 9780412372902. Rechercher dans le document numérisé
- [13] Levi T, Wilmers CC, *Wolves-coyotes-foxes : a cascade among carnivores* ; Ecology. 2012 Apr ;93(4) :921-9 (Résumé)
- [14] Berger KM, Gese EM., *Does interference competition with wolves limit the distribution and abundance of coyotes ?* ; J Anim Ecol. 2007 Nov ; 76(6) :1075-85.
- [15] Berger KM, Gese EM, Berger, *Indirect effects and traditional trophic cascades : a test involving wolves, coyotes, and pronghorn*. J. Ecology. 2008 Mar ; 89(3) :818-28.
- [16] Berger KM, Conner MM., *Recolonizing wolves and mesopredator suppression of coyotes : impacts on pronghorn population dynamics*. Ecol Appl. 2008 Apr ; 18(3) :599-612.

5 Annexes

5.1 Articles connexes

- Renard des sables
- Fennec
- Chacal
- Coyote
- Loup
- Renard volant
- Lancer de renard

5.2 Liens externes

- [Beaucoup d'information sur le renard rouge \(nl\)](#)
- [Une page sur les kitsune et les renards \(anglais\)](#)
-  [Portail des mammifères](#)
-  [Portail des canidés](#)

6 Sources, contributeurs et licences du texte et de l'image

6.1 Texte

- **Renard** *Source* : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Renard?oldid=117106301> *Contributeurs* : Aoineko, Ryo, Vargenau, Hemmer, Céréales Killer, Jmtrivial, Delorme, Kelson, Boism, Greudin, Raph, Zubro, FoeNyx, ZeroJanvier, Dhenry, Yggdras, Spedona, Sebb, MedBot, Gus-trot, Urhixidur, Sam Hocevar, VIGNERON, Nnemo, David.Monniaux, Oblic, Jmskobalt, Phe-bot, Domsau2, MG, Pfinge, ~Pyb, Weft, Roosevelt, Hégésippe Cormier, Jblndl, Jean-no, Valérie75, Maraudeur, Sinaloa, J-nam2, Jef-Infojef, Yug, Bradipus, Chris a liege, PivWan, ²⁰¹⁰⁰, Vincnet, Pj.piotr, Leag, Erasmus, En rouge, Christophe.moustier, Goldy, Pallas4, Badzil, DocteurCosmos, Jodelet, Gede, Chobot, Romanc19s, OldLion, Lgd, Lmaltier, Frédéric-FR, Thedreamtree, Gzen92, TwoWings, Davdd, PNguyen, Ash Crow, Triton, Jerome66, Passoa15, Litlok, Crouchineki, Loveless, Setrak, Hexasoft, Cehagenmerak, Jrcourtois, Harrieta171, Julien Grassot, Blidu, Djidane39, Fabrice Ferrer, Gabi88, Thidras, Hexabot, Playtime, TiChou, 0000, Freddo, Malta, Eltan, Epsilon0, Lamiot, Moumousse13, Vinz1789, Perditax, NicoV, Elemlah, Maloq, Diti, Jarfe, Marvoir, Salix, A2, Escarbot, Supvince, Laurent Nguyen, Asram, Le Pied-bot, JAnDbot, Starus, Rhizome, Kzo, Leptictidium, Clem23, Fm790, Thesupermat, Sebleouf, PurpleHz, CommonsDelinker, Eiffele, Palamède, VonTasha, Analphobot, Nico86, Jplm, Tejgad, Womenstreet, Salebot, Jerome.zf, Carthae, Martial75, Stef48, Idioma-bot, VolkovBot, Tognopop, Richardbl, Theoliane, Kango, Gz260, Chmlal, TrustNoBot, SieBot, SuperHeron, JLM, Ange Gabriel, Alecs.bot, Goupil libertin, Croc, PlexusSolaris, Virda, Alphos, Sardur, Restefond, Nortmannus, StefBot, HerculeBot, Maurilbert, Letartean, ZetudBot, PP Tom, Terretaz, Vioxx, Onial Khan, Dhegiha, Boodies~frwiki, JackPotte, Yonatanboinet, Luckas-bot, Totodu74, Der Sheriff, Vyk, Jotterbot, GrouchoBot, Tsaag Valren, 75vntineuQ, MauritsBot, Wiki-User03, DSisyphBot, Penjo, Le sourcier de la colline, D4m1en, SassoBot, Baufoy, Xqbot, Technicolors, JackBot, Alex-F, Vincent.vaquin, Sylvainrenard, Gaspardetende, Luz on the moon, Coyote du 57, Lomita, Pascal.kotte, Orlodrim, TobeBot, Alex Boy, Blood Destructor, Tomtom67, Celyndel, Anneyh, Allusion, KamikazeBot, SeoMac, Bonjour, Emaus-Bot, Kilith, Kvardek du, Supporterhéninois, IJKL, JoleK, WikitanvirBot, Jules78120, Charlotte au fraise, Weykipedia, Antaj7co, 0x010C, MerllwBot, Bertol, OrlodrimBot, Le pro du 94 :), WILD HARE, Léopard-35, Titlutin, Alec Orca, TheSwissRider, Torvalu4, Enrevseluj, Hahahapisscacaca, Albeurt234, Housterdam, Boudesv, MissShOusHou, Oeoeoeoe21, Addbot, Leswalou, Sismarinho, NB80, Alexaa8, Tupuduboudubat, Fourvote, Boubiise, Samuyyelu, Tomdu276, Tytuu, Do not follow, Jacquesbernadette2000, JojoMarg et Anonyme : 273

6.2 Images

- **Fichier:Alopex_lagopus,_Asahikawa_Asahiya_Zoological_Park.jpg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Alopex_lagopus%2C_Asahikawa_Asahiya_Zoological_Park.jpg *License* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : (talk) *Artiste d'origine* : (talk)
- **Fichier:Disambig_colour.svg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Disambig_colour.svg *License* : Public domain *Contributeurs* : Travail personnel *Artiste d'origine* : Bub's
- **Fichier:Dog.svg** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/89/Dog.svg> *License* : Public domain *Contributeurs* : ? *Artiste d'origine* : ?
- **Fichier:Fairytales_bookmark_gold.svg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Fairytales_bookmark_gold.svg *License* : LGPL *Contributeurs* : File:Fairytales bookmark gold.png (LGPL) *Artiste d'origine* : Caihua + Lilyu for SVG
- **Fichier:Fairytales_bookmark_silver.svg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Fairytales_bookmark_silver.svg *License* : CC BY-SA 3.0 *Contributeurs* : File:Fairytales bookmark silver.png (LGPL) + Travail personnel *Artiste d'origine* : Hawk-Eye
- **Fichier:Fennec_Fox_@_Africa_Alive,_Lowestoft.jpg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Fennec_Fox_%40_Africa_Alive%2C_Lowestoft.jpg *License* : CC BY 2.0 *Contributeurs* : Fennec Fox @ Africa Alive, Lowestoft *Artiste d'origine* : Tim Parkinson from Some place, The world
- **Fichier:Gtk-dialog-info.svg** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Gtk-dialog-info.svg> *License* : LGPL *Contributeurs* : <http://ftp.gnome.org/pub/GNOME/sources/gnome-themes-extras/0.9/gnome-themes-extras-0.9.0.tar.gz> *Artiste d'origine* : David Vignoni
- **Fichier:Mouse.svg** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Mouse.svg> *License* : CC-BY-SA-3.0 *Contributeurs* : No machine readable source provided. Own work assumed (based on copyright claims). *Artiste d'origine* : No machine readable author provided. Madprime assumed (based on copyright claims).
- **Fichier:Renardteteherbe.jpg** *Source* : <https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7f/Renardteteherbe.jpg> *License* : CC BY 2.0 *Contributeurs* : <http://www.flickr.com/photos/dominiqs/2430885766/> *Artiste d'origine* : Dominico Salvagnin
- **Fichier:Urocyon_littoralis_pair.jpg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Urocyon_littoralis_pair.jpg *License* : Public domain *Contributeurs* : ? *Artiste d'origine* : ?
- **Fichier:Vulpes_vulpes_sitting.jpg** *Source* : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Vulpes_vulpes_sitting.jpg *License* : Public domain *Contributeurs* : <http://www.nps.gov/acad/photos/redfox.htm> *Artiste d'origine* : ?

6.3 Licence du contenu

- Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0